

✓ fruttiferi ✓ orticole ✓ floreali e ornamentali ✓ tappeti erbosi

Trattamenti del periodo



Giugno-Luglio

LINFA spa Cura del Verde
Via Don Milani, 1 - 42043 Gattatico (RE) - Tel. 0522 908702/4 - Fax 0522 908890 - info@linfaspa.it

Fruttiferi

DOSI RIFERITE A 10 LITRI D'ACQUA

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
VITE (da pre-fioritura a chiusura grappolo)	<i>Peronospora + Oidio</i>	Da pre fioritura ad inizio ingrossamento acini intervenire con Cumeta Flow a 40 ml in miscela con Concorde 40 EW a 6 ml oppure Biotiol a 40 g. Eseguire un massimo di 4 trattamenti a 10 giorni d'intervallo. Oppure, trattare ogni settimana con Linfa Poltiglia Bordolese a 50 g (oppure con Solar Rame a 50 ml) in miscela con Biotiol a 30-40 g. (oppure con Biotiol Flow a 40 ml). Da inizio ingrossamento acini a chiusura grappolo, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese a 50 g (oppure Solar Rame a 50 ml) in miscela con Biotiol Flow a 30-40 ml.
	<i>Tignole</i>	In pre-chiusura grappolo, contro la seconda generazione della tignola, trattare con Conserva SC alla dose di 8 ml oppure Meteor a 9 ml. oppure Dora GF a 70 ml. Irrorare con cura i grappoli e ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Cicaline</i>	Alla comparsa delle prime forme mobili sulle foglie, trattare con Dora GF a 70 ml oppure con Oikos a 18 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Scarabeo giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago, trattare nel mese di giugno, in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF in miscela con Roris GF a 200 ml (oppure in miscela con Meteor alla dose di 10 ml.). Ripetere dopo 10 giorni.
	<i>Clorosi ferrica</i>	Distribuire lungo il filare, a circa 50 cm dal tronco, Linfa Ferrochelato-EDDHA alla dose di 50 g per pianta disciolti in 15-20 litri di acqua.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Effettuare un'applicazione fogliare di Scudo Verde alla dose di 100-150 ml.
MELO e PERO (ingrossamento dei frutti)	<i>Ticchiolatura + Oidio</i>	Trattare con Concorde 40EW alla dose di 10 ml in miscela con Biotiol alla dose di 20-30 g. (oppure con Solar Rame a 40 ml in miscela con Biotiol Flow a 30 ml). Trattare ogni 10 giorni fino alla fase di inizio ingrossamento dei frutti.
	<i>Maculatura bruna del pero</i>	In previsione di pioggia, trattare con Concorde 40EW alla dose di 10 ml. oppure con Solar Rame a 40 ml. Sulle varietà sensibili (Abate Fetel, Decana, ecc.) effettuare 3-4 interventi, uno ogni 10 giorni.
	<i>Afide verde del melo</i>	Alla comparsa delle prime colonie, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Dora GF a 70 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Psilla del pero</i>	In presenza di melata, irrorare la chioma con Roris GF alla dose di 200 ml. in miscela con Dora GF a 70 ml. Distribuire un volume elevato di acqua. Ripetere l'intervento dopo 5-7 giorni. In assenza di melata trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Meteor a 9 ml. Ripetere dopo circa 10 giorni.
	<i>Cimice asiatica</i>	In presenza di adulti e forme giovanili, trattare con Meteor a 9 ml (oppure con Dora GF a 100 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Ripetere dopo 7 giorni. In seguito, intervenire tutte le volte che si riscontrano le cimici sulla coltura.
	<i>Verme delle mele Ricamatori della frutta</i>	Ai primi di giugno (contro le ultime larve della prima generazione del verme delle mele) e ai primi di luglio (contro le larve di seconda generazione), trattare con Conserva SC a 12 ml oppure con Meteor a 6 ml. oppure con Dora GF a 70 ml. Irrorare con cura la vegetazione e ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Meteor a 10 ml. Ripetere il trattamento dopo 10 giorni
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili trattare con Akamor GF alla dose di 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Irrorare con cura la vegetazione e ripetere dopo 7 giorni.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
MELO (ingrossamento dei frutti)	<i>Butteratura amara</i>	Durante l'accrescimento dei frutti, trattare con Solar Calcio alla dose di 20 ml. Effettuare 4-5 interventi, uno ogni 10-14 giorni, irrorando accuratamente i frutti.
PESCO, NETTARINE (da ingrossamento frutti a invaiatura/ pre-raccolta)	<i>Bolla Oidio</i>	Per la lotta combinata bolla+oidio trattare ogni 10 giorni, fino a metà giugno, con Solar Rame a 50 ml. in miscela con Biotiol Flow a 30 ml (oppure in miscela con Concorde 40EW alla dose di 10 ml) In seguito, contro il solo oidio, trattare con Biotiol Flow alla dose di 30 ml oppure con Biotiol a 30 g oppure con Concorde 40EW alla dose di 10 ml.
	<i>Monilia del frutto</i>	Sulle varietà precoci trattare, ogni 10 giorni fino a 14 giorni prima della raccolta, con Biotiol Flow a 40 ml con oppure con Concorde 40EW a 10 ml.
	<i>Afide verde Afide nero</i>	Alla comparsa degli afidi, possibilmente su foglia non arrotolata, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml. Se necessario, ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Tignola Orientale Anarsia</i>	Dalla metà di giugno trattare Dora GF a 70 ml (oppure con Conserve SC alla dose di 12 ml) ogni 7-10 giorni fino a 7 giorni prima della raccolta. Oppure, trattare con Meteor alla dose di 9 ml ogni 14 giorni fino a 3 giorni dalla raccolta. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Cocciniglia bianca</i>	I primi di giugno intervenire contro le neanidi migranti con Olover GF alla dose di 200 ml.
	<i>Mosca Mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)</i> <i>Mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis)</i>	Contro gli adulti della mosca, appena si osservano le prime catture di adulti con le trappole cromotropiche, trattare con Spintor Fly . Diluire 100 ml di prodotto in 400 ml di acqua e applicare con spruzzatore a goccia grossa su una parte della chioma esposta al sole (a sud) a circa 2 metri di altezza, avendo l'accortezza di ricoprire, con 25-30 spruzzate ripetute (circa 30 ml per pianta), una chiazza di vegetazione di 30-40 cm di diametro. Mantenere protetta la coltura fino alla raccolta effettuando più trattamenti, uno ogni 7 giorni.
	<i>Cimice asiatica</i>	In presenza di adulti e forme giovanili, trattare con Dora GF a 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml (oppure in miscela con Meteor alla dose di 9 ml). Ripetere dopo 7 giorni. In seguito, intervenire tutte le volte che si riscontrano le cimici sulla coltura.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml (oppure in miscela con Meteor a 10 ml). Ripetere dopo 10 giorni.
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili trattare con Akamor GF alla dose di 250 ml. Ripetere dopo 7 giorni.
ALBICOCCO (da ingrossamento frutti a pre-raccolta)	<i>Oidio</i>	Trattare con Biotiol alla dose di 30 g oppure con Biotiol Flow a 30 ml.
	<i>Monilia del frutto</i>	Trattare con Biotiol alla dose di 30 g oppure con Biotiol Flow a 30 ml.
	<i>Anarsia</i>	Sulle varietà tardive, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Conserve SC alla dose di 12 ml.
	<i>Mosca Mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)</i> <i>Mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis)</i>	Contro gli adulti della mosca, appena si osservano le prime catture di adulti con le trappole cromotropiche, trattare con Spintor Fly . Diluire 100 ml di prodotto in 400 ml di acqua e applicare con spruzzatore a goccia grossa su una parte della chioma esposta al sole (a sud) a circa 2 metri di altezza, avendo l'accortezza di ricoprire, con 25-30 spruzzate ripetute (circa 30 ml per pianta), una chiazza di vegetazione di 30-40 cm di diametro. Mantenere protetta la coltura fino alla raccolta effettuando più trattamenti a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml oppure in miscela con Meteor alla dose di 10 ml.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
CILIEGIO (da invaiatura a post raccolta)	<i>Cilindrosporiosi</i>	In post raccolta, alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie (macchie rossastre), trattare con Solar Rame alla dose di 50 ml.
	<i>Mosca delle ciliegie</i>	Contro gli adulti della mosca, trattare dall'invaiatura (cambiamento di colore dei frutti) con Spintor Fly . Diluire 100 ml di prodotto in 400 ml di acqua e applicare con spruzzatore a goccia grossa su una parte della chioma esposta al sole (a sud) a circa 2 metri di altezza, avendo l'accortezza di ricoprire, con 25-30 spruzzate ripetute (circa 30 ml per pianta), una chiazza di vegetazione di 30-40 cm di diametro. Trattare tutte le piante effettuando un massimo di 5 trattamenti all'anno a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Ifantria</i>	In presenza dei primi nidi (metà giugno), trattare nelle ore serali con Dora GF a 70 ml in miscela con Roris GF a 200 ml. In alternativa, trattare con Conserve SC alla dose di 10 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare nel mese di giugno, in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Meteor a 10 ml.
SUSINO (da ingrossamento frutti a raccolta delle varietà precoci)	<i>Monilia del frutto</i>	Trattare con Biotiol Flow a 30 ml oppure con Biotiol alla dose di 30 g fino a una settimana prima della raccolta.
	<i>Ruggine</i>	Alla comparsa delle prime pustole rugginose sulle foglie, trattare con Biotiol Flow alla dose di 40 ml oppure con Biotiol alla dose di 30 g. Ripetere il trattamento dopo 10 giorni.
	<i>Afide farinoso</i>	In presenza delle prime colonie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml in miscela con Olover GF a 100 ml. Irrorare con cura la vegetazione e ripetere dopo 7 giorni.
	<i>Cidia funebrana</i>	Dora GF alla dose di 70 ml oppure Conserve SC alla dose di 12 ml. Ripetere l'intervento dopo una settimana.
	<i>Ifantria</i>	In presenza dei primi nidi (metà giugno), trattare nelle ore serali con Dora GF a 70 ml in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Meteor alla dose di 10 ml.
OLIVO (da allegagione a frutto in accrescimento)	<i>Cocciniglia Mezzo grano di pepe</i>	In luglio, in presenza delle prime neanidi sulle foglie, trattare con Dora GF a 70 ml (oppure con Meteor alla dose di 9 ml) in miscela Olover GF alla dose di 200 ml.
	<i>Tignola</i>	A fine giugno-primi di luglio, contro la generazione carpofaga (che si alimenta del frutto), trattare con Dora GF a 70 ml oppure con Meteor a 9 ml. Ripetere il trattamento dopo 14 giorni.
	<i>Mosca delle olive</i>	A fine luglio, sulle olive da mensa, appena si notano le prime punture di ovodeposizione sulla drupa, trattare contro gli adulti con Spintor Fly . Diluire 100 ml di prodotto in 400 ml di acqua e applicare con spruzzatore a goccia grossa su una parte della chioma esposta al sole (a sud) a circa 2 metri di altezza, avendo l'accortezza di ricoprire, con 25-30 spruzzate ripetute (circa 30 ml per pianta), una chiazza di vegetazione di 30-40 cm di diametro. Per la difesa contro tutti i voli della mosca effettuare un massimo di 8 trattamenti all'anno a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Margaronia</i>	In luglio, alla comparsa delle prime erosioni sugli apici fogliari, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Oziorrinco</i>	Appena si nota la presenza degli adulti sulla vegetazione (erosioni a mezza luna sulle foglie), trattare nelle ore serali con Dora GF alla dose di 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Allegagione</i>	Ad allegagione avvenuta, trattare con LinfaPlus alla dose di 10 ml.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
AGRUMI (ingrossamento dei frutti)	<i>Cotonello e altre cocciniglie</i>	In presenza delle prime colonie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml (oppure Meteor alla dose di 8 ml) in miscela con Olover GF a 200 ml.
	<i>Afide bruno</i> <i>Mosche bianche</i>	Alla comparsa delle prime colonie di afidi sugli apici dei germogli o dei primi adulti di mosche bianche, trattare con Dora GF a 70 ml oppure con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Meteor alla dose di 8 ml oppure con Oikos a 15 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Minatrice serpentina</i>	Da luglio in avanti, appena si osservano sulle foglie le prime mine della Minatrice serpentina, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml. Ripetere dopo 7 giorni.
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili trattare con Akamor GF a 250 ml. Ripetere dopo 7 giorni.
	<i>Fitoftora</i>	Se la pianta è sofferente (filloptosi, crescita stentata) trattare con Solar Rame alla dose di 50 ml oppure con Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
	<i>Clorosi ferrica</i>	Distribuire sul terreno, lungo la circonferenza di proiezione della chioma, Linfa Ferrochelato-EDDHA alla dose di 100 g per pianta disciolti in 25 litri di acqua.
	<i>Allegagione</i>	Ad allegagione avvenuta, trattare con LinfaPlus alla dose di 10 ml.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Effettuare un'applicazione fogliare di Scudo Verde alla dose di 100-150 ml, irrorando con cura anche la base del tronco.
KIWI (ingrossamento dei frutti)	<i>Clorosi ferrica</i>	Lungo la circonferenza di proiezione della chioma, distribuire Linfa Ferrochelato-EDDHA alla dose di 100 g per pianta disciolti in 25 litri di acqua.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Effettuare un'applicazione fogliare di Scudo Verde alla dose di 100-150 ml.
	<i>Batteriosi</i>	Trattare con Solar Rame alla dose di 50 ml. oppure con Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g.
	<i>Cocciniglia bianca</i>	Trattare con Olover GF alla dose di 200 ml.
	<i>Cimice asiatica</i>	In presenza di adulti e forme giovanili trattare con Dora GF a 100 ml (oppure con Meteor alla dose di 9 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Ripetere dopo 7 giorni. In seguito, intervenire tutte le volte che si riscontrano le cimici sulla coltura.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF alla dose di 100 ml in miscela con Roris GF a 200 ml, oppure con Meteor alla dose di 10 ml.

CONCIMAZIONE (frutticoltura, vite, olivo, agrumi)

Sulla superficie di terreno coperta dalla chioma, ogni 30-40 giorni distribuire il concime granulare **Azovel** alla dose di 150 g per pianta.

Durante la fase d'ingrossamento dei frutti si raccomanda di effettuare 2-3 trattamenti fogliari, a cadenza settimanale, con il concime idrosolubile **Solubis Orto-Frutticole** alla dose di 10 g disciolti in 10 litri d'acqua.

È anche possibile effettuare la concimazione fogliare in miscela con i fitofarmaci di produzione Linfa ad esclusione di Roris GF e Akamor GF.

Nella coltivazione dei piccoli frutti, per conservare il giusto grado di acidità del terreno, distribuire uniformemente 40-50 g/mq di **Linfa Antimuschio & Rinverdente** sul terreno, quindi annaffiare.

**BARRIERA PROTETTIVA
CONTRO I PARASSITI**

**la pianta
che protegge
le piante!**

Dora greenforce® **OLIO EMULSIONABILE DI NEEM**

Composizione - Olio di Neem puro in concentrato emulsionabile.

Caratteristiche - Dora® è un concentrato emulsionabile a base di olio ottenuto tramite spremitura a freddo dei semi di Neem (*Azadirachta indica*), pianta sempreverde originaria dell'India e della Birmania. Dall'odore pungente, agiaceo, simile allo zolfo, Dora® è ricco di nutrimenti naturali in grado di migliorare il benessere generale delle piante, anche creando una barriera protettiva nei confronti dei parassiti:

- **animali**, in particolare contro gli stadi giovanili di afidi, aleurodidi, tripidi, cocciniglie, neanidi di cimici, metcalfa, minatori fogliari, larve di Lepidotteri (come Cavolaie e la Tignola del geranio), larve di Coleotteri (come la Dorifora della patata, altiche ed elateridi), Acari (ragnetto rosso), Ditteri, Imenotteri, Cavallette e Nematodi;
- **funghi**, in particolare contro oidi, peronosspore, marciumi, muffe, ruggini e macchie necrotiche in genere.

Dora® può essere applicato su fruttiferi, orticole, ornamentali, tappeti erbosi, sia per nebulizzazione fogliare che per irrigazione.

Periodo di applicazione - Dora® può essere applicato durante tutte le fasi vegetative, dal post-trapianto fino alla pre-raccolta.

Modalità, dosi e frequenza d'impiego

Agitare prima dell'uso. Stemperare in poca acqua la dose indicata e, sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. La soluzione diluita pronta all'uso deve essere utilizzata tutta.

Nebulizzazione fogliare - (dose: 70 ml in 10 litri d'acqua). Con spruzzatore, pompa a spalla o altro idoneo irroratore, distribuire uniformemente su tutta la vegetazione, anche all'interno della chioma e la pagina inferiore delle foglie. Il prodotto è sensibile ai raggi del sole: nebulizzare nelle ore più fresche e poco luminose della giornata, possibilmente dopo il tramonto. Ripetere dopo 7-10 gg (e comunque sempre dopo una pioggia dilavante), aumentando la frequenza d'applicazione durante i mesi più caldi o le stagioni piovose.

Irrigazione - (dose: 100 ml in 10 litri d'acqua). Distribuire uniformemente sulla superficie (3-4 litri per mq) oppure localizzare sulla fila subito dopo il trapianto (100-200 ml per piantina). Ripetere dopo 2 settimane.

Avvertenze - Conservare preferibilmente a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Alle basse temperature il prodotto può addensare, fatto che non ne pregiudica le caratteristiche agronomiche: in questo caso è opportuno riporre la confezione per qualche ora a temperatura ambiente. **Per le colture edibili si consiglia di far trascorrere almeno 3 giorni dal trattamento prima di consumare il raccolto.**

Compatibilità - Dora® si usa generalmente da solo. Si consigliano sempre piccoli saggi preliminari in caso di miscela con altri prodotti.

Formato	Codice	Codice EAN	Pezzi x cartone
100 ml	7490	8014815011443	28
250 ml	7500	8014815011436	20

**fruttiferi
orticole
ornamentali
tappeti erbosi**



Orticole

DOSI RIFERITE A 10 LITRI D'ACQUA



COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
PATATA (da accrescimento vegetativo a fioritura)	<i>Peronospora</i>	In previsione di pioggia, trattare con Cumeta Flow alla dose di 40 ml. effettuando 2-3 interventi a 10 giorni d'intervallo. Oppure, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese a 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml, effettuando 4-5 interventi a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Alternaria</i>	Alla comparsa delle prime macchioline scure sulle foglie, trattare con Cumeta Flow a 40 ml oppure con Linfa Poltiglia Bordolese a 60 g oppure con Solar Rame a 50 ml.
	<i>Dorifora</i>	Alla comparsa delle prime larve, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (oppure con Conserve SC a 4 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Oppure trattare con Oikos a 18 ml. Ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Afide verde</i>	In presenza delle prime colonie, irrorando con cura la vegetazione, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos alla dose di 18 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Scudo Verde alla dose di 100-150 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni, fino all'inizio della fioritura.
PEPERONE (da fioritura ad accrescimento frutti)	<i>Antracnosi</i>	Alla comparsa delle prime macchie scure sui frutti maturi, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese a 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml.
	<i>Oidio</i>	Alla comparsa dei primi sintomi, intervenire con Biotiol Flow alla dose di 40 ml oppure con Concorde 40EW alla dose di 12 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni.
	<i>Afidi</i>	In presenza delle prime colonie, irrorando con cura la vegetazione, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Dora GF a 70 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Mosche bianche</i>	Alla comparsa dei primi adulti, trattare con Dora GF a 70 ml oppure con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos a 15 ml oppure con Meteor a 9 ml. Irrorare con cura la vegetazione, compresa la pagina inferiore delle foglie.
	<i>Tripidi</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml (in miscela con Roris GF alla dose di 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml
	<i>Piralide</i>	Appena si osserva la presenza degli adulti sulla coltura, trattare con Dora GF a 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Meteor a 9 ml. Ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Cimice asiatica</i>	In presenza di adulti e forme giovanili, trattare con Dora GF a 100 ml (oppure con Meteor a 9 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Ripetere dopo 7 giorni. In seguito, intervenire tutte le volte che si riscontrano le cimici sulla coltura.
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili, trattare con Akamor GF alla dose di 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Ripetere dopo 7 giorni.
	<i>Nematodi galligeni</i>	In post trapianto, nei terreni in cui le piante hanno manifestato la presenza di galle sulle radici l'anno precedente, distribuire per fertirrigazione sulla fila nella fascia di terreno esplorata dalle radici, Dora GF a 100 ml oppure Oikos a 15 ml in 20-30 litri d'acqua per 100 mq. (circa 100-200 ml di soluzione per pianta). Effettuare 3-4 trattamenti, uno ogni settimana circa. Nei terreni alcalini si consiglia di acidificare la soluzione con Acquolina alla dose di 3 tappi misurino per 10 litri di acqua.
	<i>Allegagione</i>	LinfaPlus alla dose di 10 ml. Ripetere dopo 2 settimane.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Scudo Verde alla dose di 100-150 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
POMODORO (da fioritura a pre-raccolta)	<i>Peronospora Batteriosi</i>	In previsione di pioggia, trattare con Cumeta Flow a 40 ml, effettuando 2-3 interventi a 10 giorni d'intervallo. Oppure trattare con Linfa Poltiglia Bordoiese a 50 g o con Solar Rame a 50 ml effettuando 4-5 interventi a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Oidio</i>	Alla comparsa dei primi sintomi intervenire con Biotiol Flow a 40 ml oppure con Concorde 40EW alla dose di 12 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni.
	<i>Cladosporiosi</i>	Alla comparsa dei primi sintomi, intervenire con Solar Rame a 50 ml (in miscela con Biotiol Flow a 40 ml) oppure con Concorde 40EW alla dose di 18 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni.
	<i>Alternaria Antracnosi Septoriosi</i>	Alla comparsa delle prime macchioline scure sulle foglie, trattare con Cumeta Flow a 40 ml oppure con Linfa Poltiglia Bordoiese a 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml.
	<i>Afidi</i>	In presenza delle prime colonie, irrorando con cura la vegetazione, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Dora GF a 70 ml oppure con Oikos a 15 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Nottue terricole</i>	Alla comparsa delle prime erosioni al colletto, trattare con Dora GF a 100 ml oppure con Meteor a 7 ml. Applicare nelle ore serali ed irrorare con cura le piante al colletto.
	<i>Tuta absoluta</i>	Appena si nota la presenza dei primi adulti sulla coltura, intervenire con Dora GF alla dose di 100 ml oppure Conserve SC alla dose di 10 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml. Ripetere dopo 7-10 giorni
	<i>Nottua gialla</i>	Alla comparsa dei primi frutticini danneggiati (con foro di entrata della larva), trattare immediatamente con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Meteor alla dose di 7 ml.
	<i>Minatori fogliari</i>	Alla comparsa delle prime mine sulle foglie, trattare con Dora GF a 100 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml.
	<i>Mosche bianche</i>	Alla comparsa dei primi adulti, trattare con Dora GF a 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Oikos a 15 ml oppure con Meteor a 9 ml. Irrorare con cura la vegetazione, compresa la pagina inferiore delle foglie.
	<i>Tripidi</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF a 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml
	<i>Cimice asiatica</i>	In presenza di adulti e forme giovanili, trattare con Dora GF a 100 ml (oppure con Meteor alla dose di 9 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Ripetere dopo 7 giorni. In seguito, intervenire tutte le volte che si riscontrano le cimici sulla coltura.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Meteor alla dose di 10 ml.
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili, trattare con Akamor GF a 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Ripetere dopo 7 giorni.
	<i>Nematodi galligeni</i>	In post trapianto, nei terreni in cui le piante hanno manifestato la presenza di galle sulle radici l'anno precedente applicare, per fertirrigazione sulla fila nella fascia di terreno esplorata dalle radici, Dora GF a 100 ml oppure Oikos a 15 ml. in 20-30 litri di acqua per 100 mq. (circa 100-200 ml di soluzione per pianta). Effettuare 3-4 trattamenti, uno ogni settimana circa. Nei terreni alcalini si consiglia di acidificare la soluzione con Acquolina alla dose di 3 tappi misurino per 10 litri d'acqua.
	<i>Marciume apicale</i>	Dopo l'allegagione dei primi frutticini (quando cioè sono delle dimensioni di un'oliva), trattare con Solar Calcio alla dose di 20 ml. Effettuare 3-4 interventi, uno ogni 7 giorni, irrorando accuratamente i frutti.
	<i>Allegagione</i>	LinfaPlus alla dose di 10 ml. Ripetere dopo 2 settimane.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Scudo Verde alla dose di 100-150 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
MELANZANA (da fioritura ad accrescimento frutti)	<i>Antracnosi</i>	Alla comparsa delle prime macchie scure sui frutti maturi, trattare con Solar Rame a 50 ml oppure con Linfa Poltiglia Bordoiese a 50 g.
	<i>Batteriosi</i>	In presenza delle prime macchie sulle foglie, trattare con Linfa Poltiglia Bordoiese alla dose di 50 g oppure con Solar Rame alla dose di 50 ml. Ripetere l'intervento dopo 7 giorni.
	<i>Afidi</i>	In presenza delle prime colonie, irrorando con cura la vegetazione, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Mosche bianche</i>	Alla comparsa dei primi adulti, trattare con Dora GF a 70 ml oppure con Roris GF a 200 ml oppure con Oikos a 15 ml oppure con Meteor a 9 ml. Irrorare con cura la vegetazione, compresa la pagina inferiore delle foglie.
	<i>Dorifora</i>	Alla comparsa delle prime larve, trattare con Dora GF a 100 ml (oppure con Conserve SC alla dose di 4 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml oppure con Oikos a 18 ml. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni.
	<i>Tripidi</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF a 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Meteor a 10 ml.
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili trattare con Akamor GF a 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Ripetere il trattamento dopo 7 giorni.
	<i>Allegagione</i>	LinfaPlus alla dose di 10 ml. Ripetere dopo circa 2 settimane.
PISELLO (da fine accrescimento a raccolta)	<i>Peronospora</i>	Trattare con Linfa Poltiglia Bordoiese alla dose di 50 g oppure con Solar Rame alla dose di 50 ml.
	<i>Oidio</i>	Trattare con Biotiol Flow alla dose di 40 ml oppure con Biotiol a 40 g.
	<i>Afidi</i>	In presenza delle prime colonie, irrorando con cura la vegetazione, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
FAGIOLINO FAGIOLO (dalla semina alla raccolta)	<i>Antracnosi</i>	Alla comparsa delle prime macchie nerastre sulle foglie e sui baccelli, trattare con Linfa Poltiglia Bordoiese a 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml.
	<i>Elateridi</i>	In pre-semina, irrigare lungo la fila con Dora GF alla dose di 100 ml in 10 litri d'acqua per 10 metri lineari oppure spargere uniformemente lungo la fila, richiudendo subito il solco, Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 50 g per 10 metri lineari.
	<i>Afide nero</i>	In presenza delle prime colonie, irrorando con cura la vegetazione, trattare con Dora GF a 70 ml oppure con Roris GF a 200 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Piralide (fagiolino)</i>	In presenza dei primi baccelli danneggiati dalla larva dell'insetto, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 14 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml. Ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Cimice asiatica</i>	In presenza di adulti e forme giovanili, trattare con Dora GF a 100 ml (oppure con Meteor a 9 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Ripetere dopo 7 giorni. In seguito, intervenire tutte le volte che si riscontrano le cimici sulla coltura.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare nel mese di giugno, in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Meteor a 10 ml.
	<i>Ragno rosso (fagiolino)</i>	In presenza delle prime forme mobili trattare con Akamor GF alla dose di 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Ripetere dopo una settimana.
	<i>Limacce</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, dopo averlo fissato al terreno, riempire l'apposito Dispenser per Limacce con la dose desiderata di Necolim oppure distribuire Necolim sul terreno alla dose di 40 g per 10 mq spargendo l'esca a file o a piccoli mucchietti tra le file della coltura preferibilmente alla sera o in una zona ombreggiata.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
CIPOLLA (da 4-6 foglie a pre-raccolta)	<i>Peronospora</i>	In presenza di pioggia ed elevata umidità, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g oppure con Solar Rame alla dose di 50 ml. Effettuare 2-3 trattamenti, uno ogni 7-10 giorni.
	<i>Tripide</i>	In presenza dell'insetto sulla coltura (foglie di colore giallo o argenteo) trattare con Dora GF a 70 ml (in miscela con Roris GF a 150 ml) oppure con Oikos a 15 ml oppure con Conserve SC a 10 ml. Ripetere il dopo 7 giorni.
	<i>Mosca</i>	In presenza dei primi adulti sulla coltura, rilevati con le trappole cromo- tropiche gialle, trattare con Dora GF a 100 ml oppure con Meteor a 9 ml. Ripetere dopo 14 giorni.
PORRO (accrescimento)	<i>Tignola</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 150 ml) oppure con Conserve SC a 10 ml.
LATTUGHE E SIMILI (Scarole, Indivie e Rucola) (da semina a raccolta), SPINACIO (da semina o trapianto a raccolta)	<i>Peronospora della lattuga e dello spinacio</i>	Alla comparsa delle prime macchie gialle sulle foglie vicino a terra trattare con Cumeta Flow a 40 ml. Eseguire 2-3 interventi a 10 giorni di distanza. Oppure, applicare Linfa Poltiglia Bordolese a 50 g oppure Solar Rame a 40 ml. Effettuare 3-4 interventi a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Elateridi Grillotalpa</i>	In pre-semina o pre-trapianto, irrigare lungo la fila con Dora GF alla dose di 100 ml in 10 litri d'acqua per 10 metri lineari. Oppure, spargere nel solco di semina o di trapianto Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 50 gr per 10 metri lineari, richiudendo il solco subito dopo.
	<i>Afidi</i>	Alla comparsa delle prime colonie, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Nottue fogliari</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF a 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml oppure Oikos a 20 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Minatori fogliari</i>	Alla comparsa delle prime mine sulle foglie, trattare con Dora GF a 100 ml oppure con Oikos a 20 ml.
	<i>Pentodon bidens punctatus</i>	Alla comparsa dei prime rosure al colletto causate dagli adulti dello Scarabeide su lattuga, radicchio e bietola da costa ed evidenziate dall'appassimento delle piante, contro gli adulti trattare con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Meteor a 10 ml. Contro le larve nel terreno irrigare con una soluzione di Dora GF all'1% oppure con una soluzione di Oikos allo 0,25% oppure interrare Linfa Insetticida del Terreno a 50 g per 10 mq.
	<i>Limacce</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, dopo averlo fissato al terreno, riempire l'apposito Dispenser per Limacce con la dose desiderata di Necolim oppure distribuire Necolim sul terreno alla dose di 40 g per 10 mq spargendo l'esca a file o a piccoli mucchietti tra le file della coltura preferibilmente alla sera o in una zona ombreggiata.
	<i>Stimolo delle difese naturali</i>	Scudo Verde a 100 ml. Dopo il superamento della crisi da trapianto o con piante in attiva crescita, effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 7-10 giorni.
CICORIE, CATALOGNA, SPINACIO, BIETOLA DA COSTA E DA FOGLIA (da semina-trapianto a raccolta)	<i>Afidi</i>	Alla comparsa delle prime colonie, trattare con Roris GF a 200 ml oppure con Oikos a 15 ml oppure con Meteor a 9 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Elateridi Grillotalpa</i>	In pre-semina o pre-trapianto, irrigare lungo la fila con Dora GF alla dose di 100 ml in 10 litri d'acqua per 10 metri lineari. Oppure, spargere nel solco di semina o di trapianto Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 50 g per 10 metri lineari, richiudendo il solco subito dopo.
	<i>Nottue fogliari</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml oppure Oikos a 20 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Oidio</i>	Trattare le cicorie con Biotiol Flow a 40 ml oppure con Biotiol a 40 g.
	<i>Cercospora</i>	Sulle bietole, alla comparsa delle prime macchie, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese a 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml. Ripetere dopo una settimana.
	<i>Stimolo sviluppo vegetativo</i>	LinfaPlus alla dose di 10 ml. Ripetere dopo circa 2 settimane.
	<i>Limacce</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, dopo averlo fissato al terreno, riempire l'apposito Dispenser per Limacce con la dose desiderata di Necolim oppure distribuire Necolim sul terreno alla dose di 40 g per 10 mq spargendo l'esca a file o a piccoli mucchietti tra le file della coltura.

DISPENSER


**SEMPLICE E PRATICO
DISTRIBUTORE PROTETTIVO
PER ESCE LUMACHICIDE**

Modalità d'impiego:

- 1** Ancorare il Dispenser al terreno utilizzando le due forcelle metalliche.
- 2** Alloggiare l'apposito bicchierino.
- 3** Introdurre l'esca lumachicida fino al livello desiderato.
- 4** Coprire il bicchierino con il suo tappo.

Durante i primi giorni controllare l'esca lumachicida ed integrarla se mancante. Eliminata l'infestazione, l'esca residua potrà essere smaltita secondo le norme vigenti o recuperata per un futuro riutilizzo.

**PIÙ
SICUREZZA
NEGLI IMPIEGHI
DOMESTICI**



Formato	Codice	Codice EAN	Pezzi x cartone
N. 1	6211	8014815011153	10

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
BIETOLA ROSSA RAPA (da ingrossamento radice a raccolta)	<i>Cercospora</i>	Alla comparsa delle prime macchie, trattare con Linfa Poltiglia Bordoiese alla dose di 50 g oppure con Solar Rame alla dose di 50 ml.
	<i>Afidi</i>	Alla comparsa delle prime colonie, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml.
	<i>Minatori Fogliari</i>	Alla comparsa delle prime mine sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml.
FRAGOLA (post-raccolta)	<i>Vaiolatura</i>	Alla comparsa delle prime macchie sulle foglie, trattare con Linfa Poltiglia Bordoiese a 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml. Ripetere l'intervento dopo 7 giorni.
	<i>Nottue</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Oikos a 18 ml.
	<i>Ragno rosso</i>	In presenza delle prime forme mobili, trattare con Akamor GF a 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Ripetere il trattamento dopo 7 giorni.
ANGURIA, CETRIOLO, MELONE, ZUCCHINO, ZUCCA (da accrescimento frutti a pre-raccolta)	<i>Oidio</i>	Alla comparsa delle prime macchie biancastre sulla pagina inferiore delle foglie, trattare con Biotiol Flow a 40 ml (oppure Biotiol alla dose di 30 g) in miscela con Concorde 40EW alla dose di 12 ml. Effettuare 3-4 trattamenti, uno ogni 8-10 giorni.
	<i>Peronospora, Alternaria</i> (anguria, cetriolo, melone)	In presenza di pioggia ed elevata umidità, trattare con Cumeta Flow a 40 ml. eseguendo 2-3 interventi a 10 giorni di distanza. Oppure, applicare Linfa Poltiglia Bordoiese a 50 g oppure Solar Rame a 40 ml. Effettuare 3-4 interventi a 7 giorni d'intervallo.
	<i>Afide del cotone</i>	Alla comparsa delle prime colonie, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos a 15 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Mosche bianche</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulla pagina inferiore della foglia, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Minatori fogliari</i>	Alla comparsa delle prime mine sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml.
	<i>Tripidi</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml.
	<i>Cimice asiatica su zucchini</i>	In presenza degli adulti e forme giovanili, trattare con Dora GF a 100 ml (oppure Meteor alla dose di 9 ml) in miscela con Roris GF a 200 ml. Ripetere dopo 7 giorni. In seguito intervenire ogni qualvolta si presenti il problema.
	<i>Ragno rosso (melone, cetriolo)</i>	In presenza delle prime forme mobili, trattare con Akamor GF alla dose di 250 ml. in miscela con Olover GF a 100 ml. Ripetere dopo 7 giorni.
	<i>Nematodi galligeni</i>	In post trapianto, nei terreni in cui le piante hanno manifestato la presenza di galle sulle radici l'anno precedente applicare, per irrigazione sulla fila nella fascia di terreno esplorata dalle radici, Dora GF a 100 ml oppure Oikos a 15 ml. in 20-30 litri di acqua per 10 mq. (circa 200 ml di soluzione per pianta). Effettuare 3-4 trattamenti, uno ogni settimana circa. Nei terreni alcalini si consiglia di acidificare la soluzione con Acquolina alla dose di 3 tappi misurino per 10 litri d'acqua.
	<i>Stimolo dello sviluppo vegetativo, Allegagione</i>	Trattare con LinfaPlus alla dose di 10 ml. Dallo stadio di 5-6 foglie, effettuare 3-4 trattamenti, uno ogni 10-14 giorni.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Scudo Verde alla dose di 100-150 ml. Effettuare tre applicazioni fogliari, una ogni 20 giorni circa.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
SEDANO (accrescimento)	<i>Alternaria Septoria Cercospora</i>	Alla comparsa delle prime macchie brunastre sulle foglie, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g oppure con Solar Rame a 50 ml. Ripetere dopo una settimana.
	<i>Tripidi</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC a 8 ml oppure con Oikos a 15 ml.
	<i>Afidi Minatori fogliari</i>	Alla comparsa delle prime colonie per gli afidi o dei primi sintomi per i minatori fogliari, trattare la vegetazione con Dora GF alla dose di 100 oppure con Oikos alla dose di 18 ml.
	<i>Sviluppo vegetativo</i>	LinfaPlus alla dose di 10 ml. Ripetere dopo circa 2 settimane.
	<i>Limacce</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, dopo averlo fissato al terreno, riempire l'apposito Dispenser per Limacce con la dose desiderata di Necolim oppure distribuire Necolim sul terreno alla dose di 40 g per 10 mq spargendo l'esca a file o a piccoli mucchietti tra le file della coltura preferibilmente alla sera o in una zona ombreggiata.
CAROTA (accrescimento)	<i>Alternaria</i>	Alla comparsa delle prime macchie brunastre sulle foglie, trattare con Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g oppure con Solar Rame alla dose di 50 ml. Ripetere dopo circa una settimana.
	<i>Oidio</i>	Alla comparsa dell'efflorescenza biancastra sulle foglie, trattare con Biotiol Flow alla dose di 40 ml oppure con Biotiol alla dose di 40 g. Ripetere dopo circa una settimana.
	<i>Mosca</i>	Alla comparsa dei primi sintomi, trattare la vegetazione con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos a 18 ml.
FINOCCHIO (trapianto)	<i>Elateridi</i>	In pre-trapianto, irrigare lungo la fila con Dora GF alla dose di 100 ml in 10 litri d'acqua per 10 metri lineari. Oppure, spargere nel solco di trapianto Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 50 gr per 10 metri lineari, richiudendo il solco subito dopo.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Prima del trapianto, immergere l'apparato radicale in una soluzione di Scudo Verde alla dose di 7-10 ml per litro d'acqua.
CAVOLI (Cappuccio, Verza, Cavolfiore, Broccolo, Cavolo di Bruxelles) (trapianto)	<i>Elateridi</i>	In pre-trapianto, irrigare lungo la fila con Dora GF alla dose di 100 ml in 10 litri d'acqua per 10 metri lineari. Oppure, spargere nel solco di trapianto Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 50 g per 10 lineari, richiudendo il solco subito dopo.
	<i>Afidi (cavolfiore e broccolo)</i>	In presenza delle prime colonie sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Roris GF a 200 ml oppure con Oikos a 18 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Cavolaie Nottue fogliari</i>	In presenza delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml oppure con Oikos alla dose di 18 ml oppure con Meteor alla dose di 7 ml. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Prima del trapianto, immergere l'apparato radicale in una soluzione di Scudo Verde alla dose di 7-10 ml per litro di acqua.
CARCIOFO	<i>Oidio</i>	Alla comparsa dei prime macchie biancastre sulla pagina inferiore delle foglie, trattare con Biotiol Flow alla dose di 30 ml oppure con Concorde 40EW alla dose di 10 ml. Ripetere dopo 14 giorni circa.
	<i>Afidi</i>	In presenza delle prime colonie, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Depressaria e altre nottue</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
ROSMARINO SALVIA	<i>Oidio</i>	Alla comparsa delle prime macchie biancastre sulle foglie, trattare con Biotiol Flow alla dose di 40 ml oppure con Biotiol alla dose di 40 g.
	<i>Crisolina americana del rosmarino</i> <i>Cicalina della salvia</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml in miscela con Roris GF alla dose di 200 ml.
RUCOLA	<i>Afidi</i> <i>Altiche</i> <i>Nottue</i>	Per gli afidi, in presenza delle prime colonie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Roris GF alla dose di 200 ml. Per le altiche e per le nottue, alla comparsa delle prime erosioni sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml (in miscela con Roris GF alla dose di 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml.
ASPARAGO	<i>Criocera</i>	Alla comparsa dei primi adulti trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Ruggine Stemfiliosi</i>	Alla comparsa delle prime pustole sulle foglie, trattare con Biotiol Flow alla dose di 40 ml oppure con Biotiol alla dose di 40 g.
BASILICO	<i>Macchia nera</i>	Alla comparsa delle prime macchie nerastre sulle foglie, trattare con Solar Rame alla dose di 40 ml oppure con Linfa Poltiglia Bardoiese alla dose di 40 g.
	<i>Afidi</i>	Alla comparsa delle prime colonie sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 70 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml.
	<i>Nottue fogliari</i> <i>Minatori fogliari</i>	Alla comparsa delle prime erosioni o mine sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml.

CONCIMAZIONE ORTICOLE

Concimazione di fondo per le nuove coltivazioni	Durante la preparazione dei letti di semina o di trapianto, distribuire ed interrare leggermente Suolovivo alla dose di 200-300 g/mq in miscela con il concime granulare Azolent alla dose di 40-50 g/mq. Per l'eventuale miglioramento delle proprietà fisico-chimiche del terreno, incorporare Linfa Torba Bionda alla dose di 25-30 litri/mq.
Concimazione di mantenimento per le coltivazioni in corso	Ogni 3-4 settimane, distribuire tra le interfile, interrandolo leggermente, il concime granulare Ortaggi Foglia-Frutto oppure Azovel alla dose di 30-40 g/mq per solanacee e fragola, 40 g/mq per legumi e cucurbitacee, 20 g/mq per insalate, cavoli ed erbe fresche. Durante la fase dell'ingrossamento dei frutti si raccomanda di effettuare, a cadenza settimanale, 2-3 trattamenti fogliari con il concime idrosolubile Solubis Orto-Frutticole alla dose di 10 g disciolti in 10 litri d'acqua. In alternativa, fertirrigare: - con Suolovivo Ortobiologico alla dose di 150 ml in 10 litri di acqua distribuendo 4-5 litri di soluzione/mq. Concimare ogni 30 giorni circa; - oppure con Azosang alla dose di 2 tappi misurino in 3 litri d'acqua distribuendo 4-5 litri di soluzione/mq. Concimare ogni 7-8 giorni durante l'intero ciclo vegetativo.
Concimazione Bio per l'orto in contenitore sul balcone	Inserire nel terreno i bastoncini nutritivi Nutristick Bio , a circa metà tra la pianta ed il bordo del contenitore. Il numero dei bastoncini per vaso varia in funzione del diametro del contenitore, come indicato sulla confezione. In alternativa, fertirrigare con Suolovivo Ortobiologico alla dose di 15 ml per litro d'acqua, ripetendo ogni 30 giorni circa

Suolovivo[®]

OrtoBiologico



SPECIALITÀ NUTRITIVA DI ORIGINE VEGETALE

Ortaggi • Aromatiche • Piccoli Frutti

Composizione - Concime organico NP 4.3 + 2,4 K + 14 C + 0,1 Fe + 0,05 Mn + 0,03 Zn (Ferro, Manganese e Zinco chelati con EDTA). Prodotto ottenuto unicamente con materie prime ammesse per l'impiego in agricoltura biologica.

Caratteristiche - Specialità nutritiva di pronta assimilazione ammessa per l'impiego in agricoltura biologica. A base di sostanze naturali di origine esclusivamente vegetale (borlande agroalimentari di barbabietola, di cereali e di frutta; estratti di alghe brune del genere *Ascophillum Nodosum*), Suolovivo OrtoBiologico può essere usato con sicurezza per sostenere, in modo sano ed equilibrato, tutte le fasi vegetative e produttive degli ortaggi, delle aromatiche e dei piccoli frutti.

Di particolare rilevanza agronomica la presenza di sostanze bioattive, quali:

- **Aminoacidi** (betaina in particolare) di rapida assimilazione che hanno inoltre la capacità di contrastare gli effetti negativi causati da stress di varia natura, in particolare gli eccessi di salinità e le repentine variazioni di temperatura;
- **Acidi organici del fosforo** che, favorendo la formazione di ATP e la biosintesi delle proteine nei tessuti in crescita, rappresentano una vera e propria riserva nutritiva molto attiva soprattutto nelle fasi iniziali dello sviluppo;
- **Vitamine, carboidrati** (mannitolo) e sostanze ad attività fitostimolante che determinano l'aumento qualitativo-quantitativo delle produzioni;
- **Microelementi** (ferro in particolare), per prevenire l'insorgenza di fisiopatie da carenza specifica. La forma chelata garantisce il loro pieno assorbimento in ogni tipo di terreno.

Impiegato regolarmente, Suolovivo OrtoBiologico agisce inoltre come attivatore della microflora, aumentando la fertilità complessiva del terreno. Pensato espressamente per i piccoli orti famigliari, sia in vaso (balcone, terrazzo) che in piena terra. Si somministra principalmente con le annaffiature ma può essere impiegato con sicurezza anche nelle applicazioni fogliari.

Modalità d'impiego - Agitare prima dell'uso. Diluire 15-20 ml ogni litro d'acqua, quindi annaffiare. Per piante in piena terra distribuire mediamente 4-5 litri di soluzione per mq. Dimezzare la dose (15-20 ml ogni 2 litri d'acqua) nelle applicazioni fogliari. Trattare dalle prime fasi di sviluppo fino alla raccolta, intensificando le applicazioni durante la fioritura. Somministrare nelle ore più fresche della giornata.

Frequenza d'impiego - **Orticole da foglia, orticole da frutto, orticole da radice e da bulbo**: ogni 10-15 giorni; **Aromatiche** (basilico, maggiorana, melissa, menta, dragoncello, salvia, timo, rosmarino, ecc.): ogni 7-10 giorni; **Fragola e piccoli frutti** (lampone, mora, ribes, mirtillo, uva spina, ecc.): ogni 10-15 giorni.



**ANCHE PER
IL TUO ORTO
IN VASO**

Linf

**SOSTIENE
LE FASI VEGETATIVE
E PRODUTTIVE**

Formato	Codice	Codice EAN	Pezzi x cartone
(*) 1000 ml	8038	8014815000447	12

(*) corrispondenti a 1200 grammi

Floreali e Ornamentali

DOSI RIFERITE A 10 LITRI D'ACQUA

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
ALBERI, SIEPI E ARBUSTI ORNAMENTALI	<i>Antracnosi Alternariosi</i>	Trattare con Solar Rame alla dose di 50 ml oppure con Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g oppure con Tri-Base alla dose di 40 ml.
	<i>Fitoftora e Pythium</i>	Alla comparsa della malattia applicare al terreno, mediante annaffiatura, Cumeta Flow a 40 ml oppure Scudo Verde a 50 ml. oppure Dora GF a 100 ml. Effettuare 2 trattamenti distanziati di 7-10 giorni.
	<i>Oidio</i>	Biotiol Flow a 40 ml oppure Concorde 40EW alla dose di 12 ml in miscela con Biotiol a 40 g. Effettuare 2-3 trattamenti, uno ogni 7-10 giorni.
	<i>Ruggini</i>	Alla comparsa della malattia, distribuire Solar Rame a 50 ml oppure Concorde 40EW alla dose di 25 ml. Effettuare 2-3 trattamenti, uno ogni 7-10 giorni.
	<i>Ticchiolatura della rosa e delle siepi di rosacee</i>	Alla comparsa della malattia, distribuire Solar Rame a 50 ml oppure Concorde 40EW alla dose di 12 ml oppure Linfa Poltiglia Bordolese alla dose di 50 g. Effettuare 2-3 trattamenti, uno ogni 7-10 giorni.
	<i>Guignardia dell'Ippocastano</i>	Alla comparsa della malattia, distribuire Solar Rame a 50 ml oppure Concorde 40EW alla dose di 12 ml. Ripetere il trattamento dopo circa 2 settimane.
	<i>Afidi</i>	Alla comparsa delle prime colonie di afidi, trattare con Roris GF alla dose di 200 ml oppure con Dora GF a 70 ml oppure con Oikos a 20 ml oppure con Meteor a 9 ml.
	<i>Metcalfa</i>	Trattare con Dora GF a 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml.
	<i>Cicalina Gialla della Rosa</i>	Appena si osservano le prime forme mobili sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml oppure con Oikos alla dose di 18 ml.
	<i>Aleurodidi</i>	In presenza dei primi adulti, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Oikos alla dose di 20 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml. Ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Tripidi</i>	Alla comparsa dei primi adulti sulle foglie, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF alla dose di 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 8 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml.
	<i>Oziorrinco</i>	In luglio, contro gli adulti, distribuire nelle ore serali con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Meteor alla dose di 9 ml. Ripetere dopo 10 giorni e ogni qual volta si osservassero nuove erosioni sulle foglie.
	<i>Cecidomia del bosso e della gleditsia</i>	Alla comparsa dell'infestazione, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml.
	<i>Piralide del bosso</i>	Alla comparsa delle prime erosioni sugli apici dei germogli, trattare con Cutis GF alla dose di 200 ml oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.
	<i>Psille (albizia, alloro, siliquastro)</i>	Alla comparsa dell'infestazione, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (oppure Meteor alla dose di 9 ml oppure Oikos alla dose di 15 ml) in miscela con Roris GF alla dose di 200 ml.
	<i>Cameraria e Minatori fogliari in genere</i>	Alla comparsa delle prime mine, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 20 ml oppure con Conserve SC a 30 ml.
	<i>Ifantria</i>	In presenza dei primi nidi (metà giugno), trattare nelle ore serali con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure Conserve SC a 10 ml oppure con Oikos a 15 ml. Irrorare con cura la vegetazione.
	<i>Margaronia sul gelsomino</i>	In luglio, alla comparsa delle prime erosioni sugli apici fogliari, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml oppure con Oikos alla dose di 15 ml oppure con Meteor alla dose di 9 ml.

COLTURA	PARASSITA	DIFESA (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
ALBERI, SIEPI E ARBUSTI ORNAMENTALI	<i>Processionaria della quercia</i>	Contro le larve delle ultime età, trattare con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Conserve SC alla dose di 10 ml. Irrorare uniformemente la chioma della pianta e i nidi presenti sui tronchi.
	<i>Cocciniglie (differenti specie)</i>	Trattare con Olover GF alla dose di 150 ml. Ripetere dopo circa 7 giorni.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Nelle aree del Nord Italia infestate dal fitofago trattare, nel mese di giugno in occasione della comparsa degli adulti, con Dora GF alla dose di 100 ml (in miscela con Roris GF a 200 ml) oppure con Meteor alla dose di 10 ml.
	<i>Ragno rosso Ragno giallo Eriofidi</i>	In presenza delle prime forme mobili, trattare con Akamor GF a 250 ml. Ripetere dopo 7 giorni circa.
	<i>Clorosi Ferrica</i>	Distribuire per irrigazione Linfa Ferrochelato-EDDHA alla dose di 20-50 g per pianta disciolti in 10 litri d'acqua.
	<i>Stimolo delle autodifese naturali</i>	Scudo Verde alla dose di 100-150 ml. Effettuare due applicazioni fogliari a 30 giorni di distanza una dall'altra.
ORNAMENTALI IN VASO	<i>Pythium Fitoftora</i>	Dopo il superamento della crisi di trapianto irrorare il terreno con una soluzione di Cumeta Flow a 4 ml/litro d'acqua oppure aumentare le difese naturali applicando al colletto Scudo Verde alla dose di 10 ml/litro.
	<i>Oidio</i>	Alla comparsa delle prime macchie biancastre sulle foglie, trattare con Biotiol Flow alla dose di 3-4 ml/litro oppure con Biotiol alla dose di 3-4 g/litro oppure con Concorde 40EW a 1,2 ml/litro.
	<i>Ruggini</i>	Alla comparsa delle prime pustole di ruggine sulle foglie, trattare con Solar Rame a 5 ml/litro oppure con Concorde 40EW alla dose di 2,5 ml/litro.
	<i>Tignola del geranio</i>	Intervenire verso la metà di giugno con Dora GF alla dose di 10 ml/litro d'acqua oppure con Oikos alla dose di 2 ml/litro d'acqua. Acidificare la soluzione con Acquolina alla dose di mezzo tappo misurino/litro d'acqua. Irrorare abbondantemente la vegetazione e il substrato sottostante. Ripetere dopo circa 7-10 giorni.
	<i>Afidi (varie specie) Mosche bianche</i>	Trattare con Dora GF alla dose di 10 ml/litro d'acqua oppure con Roris GF alla dose di 20 ml/litro oppure con Oikos alla dose di 2 ml/litro d'acqua.
	<i>Scarabeo Giapponese</i>	Da inizio luglio, cioè nel periodo in cui le larve sono ancora piccole e localizzate a pochi centimetri di profondità, applicare sulla superficie del terreno una soluzione di Dora GF all'1% oppure di Oikos allo 0,25%. Oppure, distribuire Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 5 g/mq. Irrigare subito dopo e ripetere dopo 7-10 giorni.
	<i>Clorosi Ferrica</i>	Viren alla dose di 15 ml in 5 litri d'acqua. Distribuire per irrigazione un volume d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente il substrato.

CONCIMAZIONE FLOREALI E ORNAMENTALI

Concimazione delle piante verdi e da fiore in vaso	Fertirrigare con i concimi liquidi specifici Linfa alla dose di 1 tappo misurino in 2 litri d'acqua oppure con i concimi idrosolubili Solubis alla dose di 30 g disciolti in 10 litri d'acqua. In estate e durante la fioritura concimare ogni settimana. Si consiglia sempre l'aggiunta di Acquolina .
Concimazione di rose, arbusti da fiore, ortensie e acidofile, conifere e sempreverdi	In funzione della specie, distribuire uniformemente il concime granulare Rose & Arbusti da Fiore oppure Ortensie & Piante Acidofile (dose media 50-100 g/pianta). In alternativa è possibile fertirrigare con i concimi liquidi specifici Linfa alla dose di 1 tappo misurino in 2 litri d'acqua oppure con i concimi idrosolubili Solubis alla dose di 30 g disciolti in 10 litri d'acqua. Per le conifere e le siepi distribuire, a inizio estate, il concime granulare Conifere & Sempreverdi alla dose di 200-250 g/pianta (60-80 g/mq).

Tappeti Erbosi



OPERAZIONE	MODALITÀ D'APPLICAZIONE (in rosso i prodotti fitosanitari uso professionale)
MALATTIE FOGLIARI	Alla comparsa delle prime manifestazioni delle malattie (Dollar spot, Oidio, Ruggini ed altre malattie fogliari), trattare con Concorde 40EW alla dose di 40 ml in 10-15 litri d'acqua per 100 mq. Oppure, potenziare le autodifese delle graminacee del tappeto erboso con Scudo Verde alla dose di 400 ml/100 mq in 10-15 litri d'acqua. Ripetere il trattamento dopo circa 14 giorni in funzione dell'evoluzione delle malattie.
FORMICHE	Distribuire Bado Formiche alla dose di 10 g sul formicaio oppure sul terreno nelle immediate vicinanze del formicaio o nei punti nei quali si vedono le formiche uscire dal terreno.
SCARABEO GIAPPONESE	A partire da inizio luglio, cioè nel periodo in cui le larve sono ancora piccole e localizzate a pochi centimetri di profondità, applicare sulla superficie del tappeto erboso, dopo averlo sfalcato, una soluzione di Dora GF all'1% oppure una soluzione di Oikos allo 0,25%. In alternativa, distribuire Linfa Insetticida del Terreno alla dose di 50 g/10 mq. Irrigare subito dopo e ripetere dopo 7-10 giorni.
TALPE	Stalpa alla dose di 100-150 ml in 10-15 litri d'acqua per 100 mq. In assenza di pioggia, annaffiare bene prima del trattamento, quindi applicare il prodotto e annaffiare nuovamente. Seguire attentamente le istruzioni d'uso.
COMPOSTAGGIO	Su ogni strato di 25 cm di residui degli sfalci del prato, degli scarti vegetali dell'orto e degli scarti umidi della cucina, distribuire BioMax tal quale alla dose di 100-150 g/mq, pressare leggermente ed annaffiare. In seguito, per mantenere la giusta umidità del compost in formazione, irrorare la massa con una soluzione di BioMax alla dose di 10 g disciolti in 3 litri d'acqua.
CONCIMAZIONE	In giugno, distribuire uniformemente il concime granulare Fertiland Keeper alla dose di 40 g/mq, quindi annaffiare per circa 15 minuti. In piena estate (luglio), per prevenire gli stress che le alte temperature potrebbero provocare, distribuire uniformemente il concime granulare Fertiland Preventer alla dose di 40 g/mq, quindi annaffiare per circa 15 minuti.

BONIFICA DALLE MALERBE - DICOTILOEDONI E GRAMINACEE, ANNUALI E PERENNI

DISERBO DI AREE CORTILIVE, VIALETTI, ARGINI, AREE RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI	In post emergenza delle infestanti e su infestanti in fase di crescita attiva, trattare con Linfa Diserbo Totale alla dose di 60-90 ml per 100 mq in 4-6 litri d'acqua. Per infestazioni a chiazze applicare una soluzione al 2% (pari a 20 ml per litro d'acqua).
--	---

DISINFESTAZIONE ZANZARE

- **PER IL CONTROLLO DEGLI STADI LARVALI** - **Bado Larve di Zanzara** alla dose di una compressa effervescente per tombino o, più in generale, una compressa ogni 40 litri d'acqua stagnante in genere.
- **PER IL CONTROLLO DEGLI ADULTI** - Trattare l'esterno degli edifici, le aree verdi circostanti, il verde pubblico e privato, con **Bado Insetticida Concentrato** alla dose di 30 ml/10 litri d'acqua (soluzione allo 0,3%) oppure con **Bado Garden** alla dose di 100 ml/10 litri d'acqua (soluzione all'1%).



preventivo e
disinfestante

DISSUASORE NATURALE

PREMESSA - Le talpe, al contrario dei topi, non trasmettono malattie e svolgono inoltre alcune funzioni agronomicamente utili, contrastando con efficacia le infestazioni di un gran numero d'insetti terricoli, oltre a contribuire all'arieggiamento del terreno. Quindi, meglio farle sopravvivere, allontanandole dalle zone che si desidera proteggere o dissuadendole dal frequentarle. La presenza delle talpe non è mai indicata dalla localizzazione dei cumuli: solo le gallerie periferiche vengono percorse più volte, mentre le gallerie di alimentazione o di caccia (quelle cioè che terminano con i fastidiosi cumuli di terra) vengono percorse una sola volta e velocemente abbandonate. Per questo, il problema che si pone con tutti i prodotti o gli articoli ad applicazione localizzata (trappole a molla, trappole elettriche, detalpatori pirotecnici, cartucce fumogene, ecc.) è quello di capire dove debbano essere collocati. Meglio quindi un prodotto che possa essere distribuito uniformemente su tutta la superficie.

CARATTERISTICHE - Dissuasore per talpe formulato con estratti naturali di origine vegetale. Al contrario dei prodotti talpicidi, è di più sicura applicazione anche sulle aree destinate al gioco e allo svago, le più frequentate da bambini e animali domestici. Liquido e di facile impiego, **Stalpa**, agendo olfattivamente, scoraggia l'ingresso delle talpe nelle aree che si vogliono proteggere (applicazioni preventive) o le allontana quando l'infestazione fosse già in atto (applicazioni disinfestanti). Il prodotto, una volta diluito alle dosi d'impiego, non presenta alcuna pericolosità per l'uomo e per l'ambiente ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008).

PERIODO D'IMPIEGO
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D

LINFASPA Cura del Verde

42043 Gattatico (Reggio Emilia) - tel. 0522 908702/4
www.linfaspa.it


MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- Salvo recente pioggia, bagnare abbondantemente l'area;
- con una normale pompa a spalla, o anche semplicemente con l'annaffiatoio, distribuire uniformemente alla dose di 50-70 ml (cc) in 6-7 litri d'acqua per 50 mq., utilizzando la dose più elevata nei casi di forte infestazione o nei terreni sabbiosi;
- al fine di far giungere il prodotto nelle zone di stazionamento delle talpe, dopo l'applicazione annaffiare nuovamente (circa 10-15 minuti d'irrigazione a pioggia).

AVVERTENZE E NUMERO DI APPLICAZIONI


- **TRATTAMENTI DISINFESTANTI** - È molto importante che l'applicazione sia uniforme su tutta la superficie e non solo dove sono più evidenti i segni della presenza indesiderata. Se necessario, ripetere il trattamento a cadenza mensile fino a totale bonifica dell'area. A dimostrazione che le talpe hanno avvertito l'azione dissuasiva del prodotto e sono in procinto di allontanarsi dall'area, nel periodo immediatamente successivo all'applicazione potrebbe notarsi un aumento della loro attività. Se dopo l'applicazione si verificasse un periodo di pioggia abbondante, a scopo precauzionale sarebbe opportuno ripetere il trattamento dopo breve tempo (il prodotto, specie nei terreni sabbiosi, potrebbe infatti essere dilavato riducendone l'efficacia).

ATTENZIONE: nel caso la superficie infestata fosse racchiusa su tre lati da una recinzione con un basamento molto profondo di cemento (figura a fianco) si consigliano delle applicazioni progressive, una ogni settimana, a partire dal lato chiuso (lato A) allo scopo di forzare l'uscita delle talpe verso l'unico lato libero di fuga (lato B).



- **TRATTAMENTI CONSERVATIVI** - Una volta bonificata la superficie, per mantenerla tale si consigliano 3/4 applicazioni annue preventive da effettuarsi a inizio primavera, metà estate e inizio autunno. Nelle grandi superfici l'applicazione può limitarsi ad una banda perimetrale di 1-2 metri di larghezza (vedi figura a fianco).

ATTENZIONE: IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI D'USO È CONDIZIONE FONDAMENTALE PER L'EFFICACIA DEI TRATTAMENTI.



BADO[®] FORMICHE

ESCA INSETTICIDA MICROGRANULARE PRONTA ALL'USO

**RAPIDA
AZIONE
ABBATTENTE**

Composizione - Cipermetrina pura (cis-trans 40/60) 0,27%; Tetrametrina pura 0,13% in supporto microgranulare.

Caratteristiche - Insetticida microgranulare pronto all'uso, attivo per contatto e ingestione, ideale per l'eliminazione di ogni tipo di formica e dei formicai. Grazie alle sue caratteristiche attrattive, le formiche operaie trasportano il prodotto all'interno del nido, determinando in breve tempo l'eliminazione dell'intera colonia. Può essere usato in ambienti domestici, civili e rurali, sia all'interno che all'esterno, come ad esempio le zone perimetrali degli edifici, dei giardini e dei prati. Il prodotto è dotato di un marcato effetto residuale.



Dosi - 10 grammi per 10-15 mq in funzione del grado d'infestazione.

Modalità d'impiego - Con l'apposita paletta spargidose acclusa nella confezione, localizzare l'applicazione sui formicai oppure nelle sue vicinanze dove transitano le formiche o in prossimità delle crepe da cui fuoriescono. Nel caso d'infestazioni più estese, distribuire uniformemente sull'intera superficie. Ripetere il trattamento nel caso il prodotto fosse dilavato dalla pioggia.



Formato	Codice	Codice EAN	Pezzi x cartone
750 g	6248	8014815011405	12

CON PALETTA SPARGIDOSE



L'esperienza ci ha insegnato che non è facile distribuire sulle piccole superfici la dose esatta degli antiparassitari e degli altri prodotti in polvere o granulari.

Escluso per comprensibili ragioni lo spargimento con e mani, anche l'impiego diretto delle confezioni non dà buoni risultati: seppur provviste di appositi fori erogatori, ci lasciano infatti quasi sempre con la confezione vuota prima di aver potuto ultimare il trattamento!

La paletta spargidose Pack-System, oltre a facilitare lo spargimento uniforme, consente di "vedere" il prodotto ancora disponibile e di regolarne il dosaggio in corso d'opera.



BADO[®] GARDEN

PER LA
PROTEZIONE
DEL VERDE
ORNAMENTALE

INSETTICIDA LIQUIDO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

Composizione - Cipermetrina (cis/trans 40/60) 9%; Geraniolo 0,5%. Microemulsione acquosa.

Caratteristiche - Insetticida liquido ad ampio spettro d'azione che si caratterizza per l'elevato contenuto di cipermetrina potenziata con geraniolo. La cipermetrina è un insetticida piretroide "universale" che, grazie alla sua residualità e attività snidante, consente il rapido e duraturo controllo degli ectoparassiti, spesso vettori di microrganismi patogeni per l'uomo e per gli animali d'allevamento. Il geraniolo, presente in molte essenze vegetali, aumenta l'azione abbattente e conferisce proprietà repellenti e antimicrobiche.

Bado Garden agisce per contatto contro numerosi insetti volanti (come Zanzara comune - *Culex pipiens*; Zanzara tigre - *Aedes albopictus*; mosche - *Musca spp.*) e striscianti (come blatte - *Blattella germanica* e altre specie; pulci - *Ctenocephalides felis*; zecche - *Ixodes ricinus*) ed è raccomandato per la protezione del verde ornamentale (prati, cespugli, siepi e viali alberati) oltre che per la disinfestazione, all'interno e all'esterno, di abitazioni private, agglomerati urbani, scuole, asili, palestre, caserme, cinema e teatri, stazioni e aeroporti, villaggi turistici e campeggi, mense, alberghi, ospedali, case di cura e di riposo, mezzi di trasporto, magazzini e locali di attività produttive e industriali, ricoveri di animali, depositi di rifiuti, fognature e discariche.

Modalità d'impiego - Stemperare in poca acqua le dosi indicate quindi, sempre agitando, portare al volume richiesto. Applicare con qualsiasi spruzzatore o nebulizzatore: pompa a spalla, atomizzatori, ULV, nebbie fredde e calde, sistemi automatici. Trattare le superfici da proteggere e, in particolare, i luoghi dove gli insetti possono ripararsi o annidarsi (angoli, crepe, fessure, anfratti, interstizi ecc.).



confezione
da 500ml

Zanzare - Per uso esterno su aree verdi. Dose: 5 ml per litro d'acqua (soluzione 0,5%). Non impiegare durante la fioritura. Per i prati ornamentali distribuendo mediamente 1 litro di soluzione per 50 mq.

Zanzare - All'interno o all'esterno degli edifici o dei ricoveri degli animali. Dose: 10 ml per litro d'acqua (soluzione 1%) distribuendo 1 litro di soluzione per 30 mq.

Mosche - All'interno o all'esterno degli edifici o dei ricoveri degli animali. Dose: 10 ml per litro d'acqua (soluzione 1%) distribuendo 1 litro di soluzione per 10 mq.

Blatte - Dose: 50 ml per litro d'acqua o solvente (soluzione 5%). Negli ambienti chiusi, la soluzione con solvente viene utilizzata con nebulizzatore nebbiogeno alla dose di 1 litro di soluzione per 1200 metri cubi.

Pulci e zecche - All'interno o all'esterno degli edifici o dei ricoveri degli animali. Dose: 10 ml per litro d'acqua (soluzione 1%) distribuendo 1 litro di soluzione per 30 mq.

Avvertenze - Soggiornare nuovamente negli spazi trattati: all'esterno, solo dopo il completo asciugamento della soluzione; all'interno, solo dopo un'adeguata aerazione. Durante il trattamento allontanare gli animali e non contaminare alimenti, bevande (o recipienti destinati a contenerne) e i corsi d'acqua. Teme il gelo.

MICROEMULSIONE ACQUOSA

L'innovativa formulazione in "microemulsione acquosa", oltre a ridurre la tossicità e l'impatto ambientale, si differenzia dalle normali emulsioni per la dimensione estremamente ridotta delle particelle disperse (comprese tra 1 millesimo ed 1 milionesimo di millimetro) garantendo, a parità di concentrazione, la migliore e la più uniforme copertura delle superfici trattate, comprese quelle sporche e porose.



Formato	Codice	Codice EAN	Pezzi x cartone
500 ml	6221	8014815011429	20